

Progress in survival

پیشرفت در بقا

1980	1990	2001	2002
1359	1369	1380	1381

Nutrition

Prevalence of undernourishment (% of population)	63.0	70.0	شیوع کم رشدی (فیضی نفوس)
Prevalence of child malnutrition (% of children under 5)			شیوع سوء تغذیه (فیضی اطفال زیر سن 5 سال)
Weight for age	49.0		وزن برای سن
Height for age	48.0		قد برای سن
Prevalence of overweight (% of children under 5)	4.0		شیوع اضافه وزنی (فیضی) اطفال 5 سال
Prevalence of anemia (% of pregnant women)			اطفال کم وزن حین تولد (فیضی تولدات)
Low birthweight babies (% of births)	20.0		تغذیه بواسیله صرف شیر ما در (فیضی اطفال زیر سن 6 ماه)
Exclusive breastfeeding (% of children under 6 months)			شیوع استعمال سگرت (فیضی 24-15 ساله)
Consumption of iodized salt (% of households)			(صرف نمک ایودین دار (فیضی خانوار
Vitamin A supplementation (% of children 6-59 months)	70.0		(اطفال فیضی 59-6 ماه A ویتا مین)

Risk factors

Prevalence of smoking (% of adults)		شیوع استعمال سگرت (فیضی جوانان)
Incidence of tuberculosis per 100,000 people	321.0	واقعیات توبرکلوز برای 100000 نفر
Prevalence of HIV (% of ages 15-24)	0.01	(فیضی 24-15 ساله) HIV شیوع ویروس

Source: Central Statistics Office, Ministry of Health, World Bank "World Dev Indicators" and UNDP "Human Dev Report"

تغذیه

عوامل خطر

شیوع استعمال سگرت (فیضی جوانان)
واقعیات توبرکلوز برای 100000 نفر
(فیضی 24-15 ساله) HIV شیوع ویروس

منبع: اداره مرکزی احصائی، وزارت صحت، بانک جهانی و UNDP

